 Tomelilla kommun	Huvudrubrik Skolhälsovård	Underrubrik Lokal rutin för skolpersonal	Dokumentnamn Handlingsplan vid allergisk reaktion
	Upprättad av: Lisbeth Andersson Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska		Utgåva 1
	Fastställd/godkänd av Richard Selméus Skolläkare		Giltig fr o m: 120822

Handlingsplan vid allergisk reaktion

Barnets namn: Födelsedata:

Allergi mot:

Lindrig eller måttlig reaktion:

Symtom:

- Klåda
- Rödflammig hud
- Nässelutslag
- Annan reaktion

Åtgärd: ge
(dosering)

Kraftig reaktion:

Symtom:


- ökande reaktion med svullnad i ansiktet
- andningsbesvär
- intensiv klåda i handflator, fotsulor och hårbotten
- blekhet
- illamående
- kallsvett
- annan reaktion

Åtgärd: Ring 112 för ambulans!

- ge adrenalinsprutan EPIPEN/ANAPEN/JEXT på lårets utsida
(Instruktion finns i förpackningen)
- antihistamin
dosering
- ge 10 st Betapred tabletter lösta i lite vatten

Om ordinerat, ge även:

- luftrörsvidgande medicin
dosering

 Tomelilla kommun	Huvudrubrik Skolhälsovård	Underrubrik Lokal rutin för skolpersonal	Dokumentnamn Handlingsplan vid allergisk reaktion
	Upprättad av: Lisbeth Andersson Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska		Utgåva 1
	Fastställd/godkänd av Richard Selméus Skolläkare		Giltig fr o m: 120822

Att tänka på:

- Upptåd lugnt, lämna inte barnet ensamt!
- En allergisk reaktion förvärras ofta vid ansträngning.
- Tag reda på vad som utlöste reaktionen. Om födoämne med ”okänt innehåll” förtärts, spar detta och kontakta miljökontoret för analys eller ta med födoämnet till sjukhuset.
- **OBS! Använd alltid original förpackningen för medicinen. Medicinen får inte på några villkor läggas i någon förpackning som inte tillhör den aktuella medicinen.**

Så här brukar barnet reagera vid en allergisk reaktion:

.....

.....

.....

VIKTIGA TELEFONNUMMER:

.....

.....

.....
Datum

.....
Personal som tagit emot informationen

.....
Vårdnadshavare

.....
Rektor

OBS! Läkemedel skall förvaras på ett säkert sätt. Kontrollera utgångsdatum regelbundet

(Denna blankett fylls i och kopieras när läkemedelsbehandlingen påbörjas/ändras. 1 ex förvaras tillsammans med läkemedlet, 1ex lämnas till förälder och 1ex lämnas till skolsköterskan.)